



Hogyan működik a Scalibor nyakörv?

Innovatív technológia, az egész testre kiterjedő védő hatás

A hatóanyag nyakörvből való fokozatos felszabadulását egy egyedülálló utánpótlási folyamat segíti elő. A bőr felületről eltűnő deltametrin azonnal pótlódik. A deltametrin feloldódik zsírokban, emiatt könnyen bejut a kutya bőrének zsírrétegébe, és befedi az egész testfelületet. A hatékony deltametrin szint kialakulásához egy-két hétre van szükség. Az, hogy a nyakörv a hatóanyagot közvetlenül és kizárólag csak a kutya szőrzetére juttatja, eltér a legtöbb nyakörv hatás-mechanizmusától, melyek esetében a hatóanyag párolgás útján szabadul fel. Ezeknél a hatóanyag nagy része a levegőbe kerül, és veszendőbe megy, így annak csak egy töredéke marad vissza a kutya védelmére.



Új véderő a paraziták ellen



Innovatív technológia

- Legújabb, az Intervet által szabadalmaztatott hatóanyag-felszabadulási technológia.
- A hatóanyag nem párolog, így a deltametrin kizárólag a kutyára kerül.

Biztonságos

A deltametrin jól ismert hatóanyag, és széles körben elfogadott tény, hogy teljesen ártalmatlan az emlősökre. A Scalibor hatóanyaga a kutya vérében még a legérzékenyebb meghatározási módszerekkel sem mutatható ki.

- Véd a kullancsoktól és lepkeszúnyogoktól,
- legújabb gyártási technológia jellemzi,
- könnyen használható,
- gyorsan hat,
- szagtalan.

A Scalibor nyakörvből felszabaduló hatóanyag kizárólag a kutyákra kerül.

Kényelmes a kutyatulajdonos számára

A Scalibor vízálló és szagtalan

- A Scalibor tökéletesen hatásos marad akkor is, ha a kutya szőre nedves, ezért a nyakörvet még akkor sem kell levenni, ha az állat vizes lesz.
 - A Scalibor nyakörv szagtalan. A kutyák szívesen viselik, a tulajdonosok pedig semmilyen szagot nem érzékelnek. A kutyát nyugodtan, minden következmény nélkül megérinthetik, még gyermekek is.
 - A Scalibor nyakörv 6 hónapig - azaz egy teljes szezonon át - tartó védelmet biztosít a kullancsok összes vérrel táplálkozó alakja - lárva, nimfa, kifejlett stádiumok - ellen!
- A nyakörv vemhes és szoptató szukáknak valamint 7 hetesenél idősebb kölyökkutyáknak is felhelyezhető.**

